

Avertissements agricoles

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION DE LA QUALITÉ

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX


B.P. 95 - 84140 MONTFAVET

Téléphone (90) 88.21.83



ISSN 0759-9616

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR



- ARBORICULTURE - CULTURES LEGUMIERES - GRANDES CULTURES -

15 Avril 1986 - N°7

ARBORICULTURE

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURES DU POMMIER et DU POIRIER -

- 1 - Les pluies observées du 6 au 9 Avril ont pu être contaminatrices dans des vergers :
 - . ayant atteint ou dépassé le stade C3-D,
 - . ayant eu des attaques de tavelures en 1985 et n'ayant pas été protégés préventivement ou en "STOP".

En cas de contaminations effectives les taches sur feuilles ou fruits pourront apparaître fin Avril début Mai.

- 2 - Quand votre verger n'est-il plus protégé ?
 - si le dernier traitement remonte à plus de 3 à 7 jours (suivant matière active)
 - si le traitement a reçu 20 mm de pluie ou 25 mm cumulés.
 - si le traitement a été effectué pendant une pluie.
- 3 - Eviter de répéter les traitements avec la même matière active.
- 4 - Pour être mieux informés :
 - sur les contaminations tavelures, téléphoner au répondeur 90.87.41.62 à Montfavet ou par Minitel au 36.15.91.77, service demandé : CIRAME, mot clé : TAVEL.
 - sur les risques de pluie téléphoner au 90.60.31.11 à Carpentras, au 42.89.29.25 à Marignane, au 94.46.54.51 à Toulon ou au 92.64.90.50 à St-Auban.

PUCERONS MAUVES -

Reprendre la lutte si nécessaire après la floraison.

CECIDOMYIE DES FEUILLES DE POIRIER -

En cas d'attaques, refaire le traitement conseillé avant floraison. On utilisera le vamidothion efficace également contre les pucerons.

OIDIUM DU POMMIER -

Préférer le soufre poudrage pendant la floraison, on choisira un produit mixte oïdium-tavelure en cas de risque de tavelure.

COGNASSIER (rappel) -

Maintenir la protection contre le monilia et l'entomosporiose.

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

CLOQUE et MONILIA SUR PECHER et NECTARINIER -

Poursuivre la protection jusqu'à l'étalement de toutes les premières feuilles et à la chute des collerettes avec notamment le thirame (nombreuses spécialités) à 200 g M.A./hl valable sur les deux maladies préventivement.

PUCERON VERT DU PECHER -

Surveiller leur présence pour intervenir aussitôt.

P.51

ANARSIA ou PETITE MINEUSE DU PECHER -

Dès les prochains réchauffements intervenir seulement sur les jeunes vergers pour protéger les rameaux en formation. Choisir un produit efficace sur la tordeuse orientale .

ACARIENS -

Début des éclosions mais évolution lente. Dans le tableau des acaricides (bulletin précédent) rectifier à la dernière ligne : flubenzimine (CROPOTEX) : actif sur les larves et non sur les oeufs d'été .

CULTURES LEGUMIERES

PLEIN CHAMP

MOUCHE DU CHOU SUR NAVET -

Le vol se poursuit. Renouveler la protection conseillée dans notre dernier bulletin. Ne pas traiter les navets récoltés avant le 1er Mai .

MOUCHE DU CHOU SUR PEPINIERES DE CHOUX - (Rappel)

Renouveler la protection conseillée dans notre dernier bulletin .

MOUCHE DE L'OIGNON -

Les premiers adultes sont sortis. Sur les jeunes semis non protégés par un épandage de micro-granulés ou les parcelles ayant subi des dégâts l'an dernier, effectuer un traitement en pulvérisation à partir du 27 Avril .

Matières actives utilisables jusqu'à 15 jours avant récolte :

bromophos méthyl (NEXION) : 50 g M.A./hl - chlorfenvinphos (BIRLANE) : 60 g M.A./hl .

MILDIU DE L'OIGNON -

Le mildiou a fait son apparition en toutes zones. Les dernières pluies ont provoqué un repiquage de la maladie. Renouveler la protection avec un des produits suivants :

cymoxanil + mancozèbe (FULVAX, REMILTINE) : 0,25 kg P.C./hl.

oxadixyl + mancozèbe + cymoxanil (PULSAN) : 0,25 kg P.C./hl .

chlorothalonil (DACONYL, FONGIL) : 150 g M.A./hl.

Le traitement sera renouvelé tous les 10 jours ou en cas de pluie supérieure 15 mm, jusqu'à 15 jours de la récolte. Alternier si nécessaire avec une matière active valable contre la rouille .

CHENILLES SUR CHOUX VERTS -

Surveiller l'envahissement des coeurs des choux par une petite chenille. Celle-ci dévore les jeunes feuilles et s'enroule dans des fils de soie .

Intervenir si nécessaire en effectuant une pulvérisation à base d'orthène (ACEPHATE) en mouillant bien le feuillage. Respecter le délai de 15 jours avant récolte .

SOUS ABRI

MILDIU DU PIED SUR JEUNES PLANTS de TOMATE et de MELON (Rappel) -

Des attaques sont susceptibles de se produire à la suite du temps froid et pluvieux, de ces derniers temps.

Appliquer au collet une solution à base de captafol (ORTHODIFOLATAN, CERETAL, etc ...) .